

Patiënteninformatie



Lumbaalpunctie

Inleiding

Binnenkort krijgt u een lumbaalpunctie. Uw arts heeft u uitgelegd wat de reden daarvan is en wat zo'n punctie inhoudt.

In deze folder kunt u het allemaal nog eens doorlezen, zodat u weet wat er gaat gebeuren tijdens en na het onderzoek.

Wat is een lumbaalpunctie

Een lumbaalpunctie is een ruggenprik waarbij vocht (=liquor) uit het ruggenmergkanaal wordt afgenomen.

Wat is het doel van een lumbaalpunctie

De samenstelling en de druk van de liquor geeft de arts informatie over aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwwortels.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de kliniek Neurologie (A4).

De verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door uw neuroloog, geassisteerd door een verpleegkundige.

In de behandelkamer neemt u plaats op bed. De punctie kan liggend of zittend worden gedaan. De neuroloog vertelt u stapsgewijs wat hij/zij doet. Eerst moet u op uw zij gaan liggen en uw knieën optrekken naar uw neus, of in een zittende houding voorover bukken. Dan wordt de rug met jodium gedesinfecteerd. Vervolgens krijgt u een prik tussen de doornuitsteeksels van de wervels onder in uw rug. Dit voelt u als een prik, zoals bij bloedafname. Het prikken is minder vervelend als u zich probeert te ontspannen. De neuroloog tapt via de ingebrachte naald vocht af voor onderzoek. In het onderste gedeelte van het ruggenmergkanaal bevindt zich geen ruggenmerg. Er bestaat daarom geen gevaar voor beschadiging van het ruggenmerg.

Hoe lang duurt het onderzoek

Het onderzoek duurt vijf à tien minuten.

Na het onderzoek

U hoeft niet te blijven liggen. Er is een kleine kans dat u na de prik hoofdpijnklachten krijgt. Deze klachten kunnen tot twee weken na het onderzoek optreden en zijn niet gevaarlijk. De hoofdpijn kunt u krijgen ten gevolge van een drukverschil in het hoofd.

Indien deze klachten zich voordoen moet u drie tot vier dagen bedrust houden en veel drinken. U kunt zelf proberen of de hoofdpijn wegblijft wanneer u rechtop gaat staan. Bij hoofdpijn kunt u eventueel een paracetamol innemen.

Neem contact op met de polikliniek als er geen verbetering optreedt of als u koorts krijgt. Afhankelijk van de reden voor de ruggenprik wordt eventueel nog bloed afgenomen op het laboratorium.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek hoort u van de neuroloog. Deze bespreekt met u welke behandeling verder mogelijk of noodzakelijk is.

Nog vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de behandelend specialist of met de verpleegkundigen van de afdeling.

Contactgegevens Neurologie

Telefoonnummer: 0251 265695

Emailadres: neurologen@rkz.nl

Rode Kruis Ziekenhuis

Redactie: Afdeling Communicatie en Afdeling Neurologie

Vondellaan 13

1942 LE Beverwijk

T : +31 (0) 251 26 5555

W : rkz.nl



/RKZ.BrandwondencentrumBeverwijk



/RodeKruisZH



/company/rode-kruis-ziekenhuis

Zorg van de Zaak

Het RKZ maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk.