

Patiënteninformatie



Ganglion Stellatum Blokkade

Uw pijnspecialist adviseert U een blokkade van het ganglion stellatum. Deze behandeling wordt toegepast bij (neuropathische) zenuwpijnen in het gezicht, nek, schouder, borst en arm. Soms wordt deze behandeling toegepast bij een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS type I) van de arm.

De behandeling

Doel van de behandeling is het onwillekeurige deel van het zenuwstelsel (sympathische zenuwstelsel) bij de zevende nekzwervel in de hals te verdoven. Bij deze behandeling wordt een speciale naald via de voorzijde van de hals geplaatst bij dit zenuwknoopje. Door middel van röntgenstraling en contrastvloeistof wordt de positie van de naald zichtbaar gemaakt. Vervolgens spuiten we het plaatselijke verdovingsmiddel in. Soms proberen we met een serie van drie blokkades (die uitgevoerd worden met twee weken tussentijd) of door de toevoeging van een pijnstillend medicijn een langdurig effect te bewerkstelligen.

Complicaties

Als zeldzame complicatie kan het longvlies worden geraakt, waardoor een klaplong (pneumothorax) kan optreden. Ook is het mogelijk dat pijnklachten (tijdelijk) toenemen. Verder kunt u allergisch zijn voor röntgencontrastvloeistof. U kunt dan last krijgen van jeuk, huiduitslag en eventueel kortademigheid. In zeldzame gevallen leidt dit tot een ernstige bloeddrukdaling.

Bijwerkingen

Direct na de behandeling ziet u misschien wazig of kan het ooglid afhangen. Ook kunt u tijdelijk een hese stem hebben. Na de behandeling kan napijn optreden op de prikplaats die enkele dagen kan duren. Hiertegen neemt u eventueel een pijnstillertje in (b.v. paracetamol).

Resultaat

De effecten van de verdoving zijn direct zichtbaar. De pijnverlichting kan echter enige dagen op zich laten wachten. Door herhaling van de blokkade kan de duur van pijnverlichting toenemen.

Let op!

- Informeer ons vóór de behandeling bij een (eventuele) zwangerschap;
- Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is moet u hier vier dagen voor de behandeling mee stoppen. Alle andere medicijnen blijft U gewoon innemen;
- Als u weet dat u een allergie heeft voor röntgencontrastvloeistof moet u ons dat van te voren melden;
- U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn;
- Na de behandeling blijft U nog twee uur in de herstelkamer;
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Rode Kruis Ziekenhuis

Redactie: Afdeling Communicatie

Vondellaan 13

1942 LE Beverwijk

T : +31 (0) 251 26 5555

W : rkz.nl



/RKZ.BrandwondencentrumBeverwijk



/RodeKruisZH



/company/rode-kruis-ziekenhuis

Zorg van de Zaak

Het RKZ maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk.