

Patiënteninformatie



Informatie over het geneesmiddel Hydroxychloroquine (Plaquenil)

Uw reumatoloog heeft Hydroxychloroquine voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom deze folder aandachtig door.

Het effect van Hydroxychloroquine

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze aandoening rustiger kunnen maken. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen. Hydroxychloroquine is zo'n medicijn. Het kan drie tot vier maanden duren voordat u merkt dat dit medicijn begint te werken. Als u al pijnstillers gebruikt kunt u deze blijven gebruiken. Indien Hydroxychloroquine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken.

Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u teveel last hebt van bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik van Hydroxychloroquine stop te zetten.

In plaats van Hydroxychloroquine wordt soms Chloroquine (Nivaquine) gebruikt, een medicijn met dezelfde werking.

Hydroxychloroquine wordt behalve bij reumatische aandoeningen ook gebruikt bij bepaalde huidziekten en malaria.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

In het algemeen kunt U Hydroxychloroquine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel toch altijd uw huisarts en specialist welke geneesmiddelen u gebruikt.

Wijze van innemen

Hydroxychloroquine is een geneesmiddel in de vorm van dragees van 200 mg. Een dragee is een pil met een suikerlaagje eromheen. De gebruikelijke onderhoudsdosis is 1 dragee per dag. Vaak schrijft uw reumatoloog in het begin een hogere dosis voor. Slik de dragees

ná de maaltijd, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. U kunt de dragees doorslikken met water en melk. Het is belangrijk dat u de dragees niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt.

Als u de dragees vergeten bent in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip nog dezelfde dag in.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van Hydroxychloroquine vermeld die ooit zijn voorgekomen. Deze bijwerkingen komen echter heel zelden voor.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- maag- en darmklachten zoals een vol gevoel, misselijkheid en braken of diarree;
- huiduitslag en jeuk;
- hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slaperigheid of juist sufheid;
- overgevoeligheid voor zonlicht;
- problemen met de ogen, zoals dubbel of wazig zien, het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen ('s avonds);
- pigmentveranderingen (verkleuringen) van huid en haren (na jarenlang gebruik van hoge dosering Hydroxychloroquine).

Wanneer een of meer van deze klachten langdurig aanhouden, breng dan uw reumatoloog hiervan op de hoogte.

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

- dubbel of wazig zien
- het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen ('s avonds)

Als u veel last hebt van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van Hydroxychloroquine. Noteer dan wel op welke dag u bent gestopt en waarom. Neem bij twijfel contact op met uw reumatoloog.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Hydroxychloroquine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid. Over

het algemeen is het veilig om het middel tijdens de zwangerschap te gebruiken. Hydroxychloroquine gaat over in de borstvoeding. Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Aanvullende informatie

Om invloed van Hydroxychloroquine op de ogen te verminderen, is het waarschijnlijk beter fel zonlicht op uw ogen te vermijden. Draag daarom wat vaker een zonnebril.

Het gebruik van alcohol in de periode dat u Hydroxychloroquine gebruikt heeft geen ongunstige invloed op de werking van het medicijn.

Bewaar geneesmiddelen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen. Voor kleine kinderen kan het slikken van enkele dragees Hydroxychloroquine levensbedreigende gevolgen hebben.

Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.

Vragen

Bij vragen kunt u bellen met de polikliniek reumatologie 0251-265212.

Rode Kruis Ziekenhuis

Redactie: Afdeling Communicatie en Afdeling Reumatologie

Vondellaan 13

1942 LE Beverwijk

Foto: Robert Koelewijn - JuistInBeeld.nl

T : +31 (0) 251 26 5555

W : rkz.nl



/RKZ.BrandwondencentrumBeverwijk



/RodeKruisZH



/company/rode-kruis-ziekenhuis

Zorg van de Zaak

Het RKZ maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Network.