

Patiënteninformatie



Videocapsule Endoscopie

Inleiding

Het videocapsule onderzoek is een onderzoek waarbij afbeeldingen van de maag en het darmkanaal worden gemaakt, met behulp van een capsule die een kleine camera bevat. Hiermee kunnen afwijkingen in het slijmvlies van met name de dunne darm worden opgespoord. De capsule is iets groter dan een vitaminepil of antibioticacapsule. Om de afbeeldingen zo mooi en scherp mogelijk te krijgen, moeten de darmen 'schoon' zijn van binnen. Hiervoor moeten de darmen worden gelaxeerd (meestal met PicoPrep of KleanPrep) en moet er een vloeibaar dieet worden gevolgd. Dit kan thuis plaatsvinden. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd verpleegkundige.

Eén week voor het onderzoek

Indien u een van de volgende medicijnen gebruikt, dient u het gebruik hiervan een week voor het onderzoek te staken. Na het onderzoek kunt u de medicatie weer voortzetten.

- Ferrosulfaat "Fero gradumet®" (IJzermedicatie)
- Ferrofumaraat (IJzermedicatie)
- Codeïne
- Loperamide "immodium®"/"diacure®"

Twee dagen voor het onderzoek

Minimaal twee liter water drinken; licht verteerbaar voedsel eten (geen fruit, bruin brood, bladgroente of vezels)

Eén dag voor het onderzoek

- U mag tot 8 uur 's morgens een licht ontbijt eten, hierbij neemt u ook 2 tabletten bisacodyl in. **Daarna** mag u **niets** meer eten, u mag wel heldere vloeistoffen drinken en éénmalig een heldere bouillon.
- Start om **12 uur** 's middags met het **eerste zakje** PicoPrep; elk uur minstens 500 ml drinken.
- Start om **6 uur** 's avonds met het **tweede zakje** PicoPrep; elk uur minstens 500 ml drinken.

(Als u behoefte heeft aan een energierijke drank, kunt u een heldere sportdrank nemen)

- **Tot 22 uur** volgt u dit heldere vloeibare dieet. **Na dit tijdstip**

mag u niets meer eten of drinken! (met uitzondering van noodzakelijke medicijnen, deze kunt u innemen met een slokje water) De PicoPrep veroorzaakt meestal een dunne diarree.

Dag van het onderzoek

Ook op de dag van het onderzoek mag u **niets eten of drinken** (met uitzondering van voorgeschreven medicijnen, deze kunt u uiterlijk 2 uur vóór het onderzoek innemen met een slokje water). Draag bovenkleding van dun, natuurlijk materiaal, zoals een T-shirt dat tenminste tot de heupen komt en niet boven de riem uit kruipt.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip in de **wachtruimte G14** van het Rode Kruis Ziekenhuis.

De verpleegkundige bevestigt een brede sensorriem om uw middel, en de Pillcam®-recorder (een klein kastje ter grootte van een walkman) aan een riem om uw schouder. U mag nu de camerapil inslikken met twee glazen water. Na een uur controleert de verpleegkundige of de capsule de maag gepasseerd is. Daarna wordt u naar een recreatie ruimte gebracht ter observatie voor de rest van de onderzoek.

Tijdens het onderzoek

- Het onderzoek kan tot ongeveer 8 uur duren. Tijdens het onderzoek dient u **ieder kwartier te controleren** of het blauwe lichtje op de Pillcam®-recorder knippert. Als het niet meer knippert of van kleur verandert, dient u contact op te nemen met de verpleegkundige (telefoonnummer: 3795)!
- **Na 2 uur** mag u water of thee (zonder melk) drinken. **Vier uur na inname** krijgt u een lichte lunch (bouillon met twee boterhammen zonder boter en/of kaas).
- Tijdens het onderzoek dient u direct zonlicht te vermijden. Roken is niet toegestaan, omdat dit de beweeglijkheid vandedarmbeïnvloedt. De apparatuur mag gedurende het hele onderzoek niet losgekoppeld worden!BehandeldePillcam®-recorder met zorg en voorkom plotseling bewegen of stoten.

- Tijdens het onderzoek wordt de positie van de capsule regelmatig gecontroleerd: zodra hij in de dikke darm is beland, wordt u afgekoppeld en kunt u naar huis.

Na afloop van het onderzoek.

Normaal gesproken verlaat de videocapsule het lichaam via de ontlasting. Indien u na enkele dagen de videocapsule (nog) niet in uw ontlasting heeft waargenomen én u krijgt last van misselijkheid, buikpijn of braken, of indien u een MRI -onderzoek moet ondergaan, dient u contact op te nemen met de afdeling MDL (maag-, darm- en leverziekten).

Medicijnlijst

Indien u medicijnen gebruikt, zou u een lijst met alle huidige medicijnen (inclusief sterkte, hoeveelheid, en reden van gebruik) mee kunnen nemen naar het intake gesprek met de verpleegkundige?

Nog even dit

Als u diabetespatiënt bent, kan het noodzakelijk zijn om voor het onderzoek de medicatie aan te passen. U kunt dit het beste even met uw arts overleggen (of met de diabetesverpleegkundige). Neem in ieder geval uw eigen medicijnen en glucosemeter mee tijdens het onderzoek.

Het onderzoek kan tot 8 uur duren, zorg dus dat u iets te doen heeft om de tijd door te komen.

Heeft u nog vragen? Bel ons gerust...

Telefoonnummer gespecialiseerde verpleegkundige: 0251-783795 (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)

Telefoonnummer afdeling MDL: 0251-265231 (indien verpleegkundige onbereikbaar)

Telefoonnummer Spoedeisende Hulp: 0251-265470 (alleen buiten kantooruren)

Rode Kruis Ziekenhuis

Redactie: Afdeling Communicatie en Afdeling MDL

Vondellaan 13

1942 LE Beverwijk

Foto: Robert Koelewijn - JuistInBeeld.nl

T : +31 (0) 251 26 5555

W : rkz.nl



/RKZ.BrandwondencentrumBeverwijk



/RodeKruisZH



/company/rode-kruis-ziekenhuis

Zorg van de Zaak

Het RKZ maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Network.