

Patiënteninformatie



Afwijkend monddrag bij kinderen.

In deze folder wordt u geïnformeerd over enkele vormen van afwijkend monddrag bij kinderen.

Onder afwijkend monddrag wordt monddrag verstaan wat niet bij de leeftijd past of monddrag wat afwijkt van normaal gezond monddrag.

Tevens worden mogelijke gevolgen hiervan beschreven.

De vormen die in deze folder aan de orde komen zijn:

1 duim-, vinger- en of speenzuigen

2 open monddrag

U heeft een bezoek gebracht aan de KNO-arts met uw kind en deze heeft u deze folder meegegeven.

De KNO-arts heeft uw kind onderzocht w.b. het gehoor en of de spraakorganen.

Taal is voor kinderen al vrij snel een belangrijk communicatiemiddel.

Als het kind begint met 'leren', verwerft het de meeste kennis via taal. En als het kind wil communiceren, is het zich kunnen uitdrukken in taal essentieel.

Bij afwijkingen in de mond of de keel kan een kind bepaalde klanken niet vormen.

Soms zijn hier organische oorzaken voor aan te wijzen, dan kan de KNO-arts hierbij helpen. Soms is de oorzaak een afwijkende mondgewoonte, zoals duimzuigen (1) of open monddrag(2).

Tevens zal uw KNO-arts er altijd op letten of uw kind wel goed hoort; een oorprobleem kan ook een oorzaak zijn van niet goed spreken. De oorzaak van oorproblemen kan organisch zijn, zoals een oorontsteking, maar ook kan afwijkend monddrag hierbij een rol spelen.

Duim-, vinger- en/of speenzuigen

Veel kinderen duimen of zuigen wel eens op hun vinger(s).

Wanneer een kind dit op driejarige leeftijd nog steeds doet, is er sprake van afwijkend monddrag.

Vanaf dat moment kan het duimen, zuigen of spenen een negatieve invloed hebben op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. Dit kan leiden tot een afwijkende vorm van het gebit wat articulatieproblemen kan veroorzaken.

Hierbij kunt u denken aan het praten met de tong tussen of tegen de tanden (slissen) of het niet goed uitspreken van bepaalde medeklinkers, als de /t/, // en combinaties hiermee.

Open monddrag

Normaal gesproken is de mond gesloten als er niet gesproken, gezongen of gelachen wordt.

De tongpunt rust dan tegen het gehemelte achter de boventanden en er wordt door de neus geademd.

Wanneer de mond gedurende de dag regelmatig open is in rust, bijvoorbeeld tijdens televisiekijken, is er sprake van open monddrag. Hierbij is er veelal sprake van slappe mondspieren en mondademen.

Wanneer dit probleem niet behandeld wordt, is er kans op incorrect articuleren en een verhoogde kans op oorproblemen.

Uw KNO-arts kan u adviseren bepaalde oefeningen met uw kind te doen om het monddrag te veranderen. Als dit niet voldoende helpt of het probleem te ingewikkeld is, kan uw kind verwezen worden naar een logopedist.

Overigens hoeft een kind bepaalde klanken, zoals de “sch” en de “r” pas rond het zesde jaar te beheersen.



Tong omhoog als bij klakken en dan laten plakken.



Lippen losjes op elkaar en...Kijken maar.

Rode Kruis Ziekenhuis

Redactie: Afdeling Communicatie en Afdeling KNO

Vondellaan 13

1942 LE Beverwijk

Foto: Robert Koelewijn - JuistInBeeld.nl

T : +31 (0) 251 26 5555

W : rkz.nl



/RKZ.BrandwondencentrumBeverwijk



/RodeKruisZH



/company/rode-kruis-ziekenhuis

Zorg van de Zaak

Het RKZ maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk.